

海外渡航者に必要な予防接種（1ヶ月以上滞在者、及び冒険旅行）

| ワクチン | 製品名 | 0 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | 東アジア | 東南アジア | 南アジア | 太平洋地域 | 中近東 | アフリカ | 北・西ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | ロシア | 北米 | 中南米 | |
|-----------------|----------------------|-----|--------------------------|----------------------------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|------------------|------------------|------|-------|------|-------|-----|------|----------|--------|-----|----|-----|---|
| A型肝炎 | エイムゲン | 1回目 | | 2回目（通常は1回目から4週、急速接種の場合は2週） | | | | | | | | 3回目 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | |
| 輸入A型肝炎 | AVAXIM・HAVRIX | 1回目 | | | | | | | | | | 2回目 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | |
| B型肝炎 | ピームゲン・ヘプタバックス | 1回目 | | | | 2回目 | | | | | | 3回目 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | |
| A・B型肝炎混合 | Twinrix | 1回目 | | | | 2回目 | | | | | | 3回目 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | |
| 破傷風 | 沈降破傷風トキソイド | 1回目 | | 2回目（昭和43年以前に生まれた方は3回接種） | | | | | | | | | | 3回目：2回目から12～18ヶ月 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 狂犬病 | ChiroRab | 1回目 | 2回目 | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | △一部 | ● | ● | | ● | ● | | ● | |
| 腸チフス | TYPHIM Vi・TYPBAR TCV | 1回目 | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | ● | |
| 日本脳炎 | ジェービック・エンセバック | 1回目 | 2回目（未接種の場合は3回接種） | | | | | | | | | | 3回目（2回目から6～18ヶ月） | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| ダニ媒介性脳炎 | FSME-IMMUN | 1回目 | 2回目（通常は1～3ヶ月、急速接種の場合は2週） | | | | | | | | | | 3回目：1回目から5～12ヶ月 | | | | | | | | | ● | | ● | | |
| 黄熱 | | 1回目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | |
| 4価髄膜炎菌(A,C,W,Y) | メナクトラ | 1回目 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |